

# Contenu de la section

## 1 Trigonométrie

La trigonométrie c'est l'étude des triangles.

La trigonométrie c'est l'étude des triangles.  
Plus spécifiquement, l'étude des liens entre

La trigonométrie c'est l'étude des triangles.  
Plus spécifiquement, l'étude des liens entre

- la mesure des angles, et

La trigonométrie c'est l'étude des triangles.  
Plus spécifiquement, l'étude des liens entre

- la mesure des angles, et
- la mesure des côtés.

La trigonométrie c'est l'étude des triangles.  
Plus spécifiquement, l'étude des liens entre

- la mesure des angles, et
- la mesure des côtés.

## Question

La trigonométrie c'est l'étude des triangles.  
Plus spécifiquement, l'étude des liens entre

- la mesure des angles, et
- la mesure des côtés.

## Question

Comment mesurer des angles?

# Contenu de la section

## 1 Trigonométrie

- La notion d'angle : généralités
- Le radian
- Définitions de sinus, cosinus, ...
- Relation fondamentale
- Symétries
- Formules de trigonométrie
- Fonctions périodiques



Intuitivement, un angle est une fraction de « faire un tour complet ».

Intuitivement, un angle est une fraction de « faire un tour complet ».  
Pour le mesurer

Intuitivement, un angle est une fraction de « faire un tour complet ».  
Pour le mesurer, on peut donner un nombre réel décrivant le nombre de tour complets.

Intuitivement, un angle est une fraction de « faire un tour complet ». Pour le mesurer, on peut donner un nombre réel décrivant le nombre de tour complets. Mais généralement on utilisera

- le degré

Intuitivement, un angle est une fraction de « faire un tour complet ». Pour le mesurer, on peut donner un nombre réel décrivant le nombre de tour complets. Mais généralement on utilisera

- le degré (1 tour = 360 degrés), ou

Intuitivement, un angle est une fraction de « faire un tour complet ». Pour le mesurer, on peut donner un nombre réel décrivant le nombre de tour complets. Mais généralement on utilisera

- le degré (1 tour = 360 degrés), ou
- le radian

Intuitivement, un angle est une fraction de « faire un tour complet ». Pour le mesurer, on peut donner un nombre réel décrivant le nombre de tour complets. Mais généralement on utilisera

- le degré (1 tour = 360 degrés), ou
- le radian (1 tour =  $2\pi$  radians)

Le radian sera notre choix !

Intuitivement, un angle est une fraction de « faire un tour complet ». Pour le mesurer, on peut donner un nombre réel décrivant le nombre de tour complets. Mais généralement on utilisera

- le degré (1 tour = 360 degrés), ou
- le radian (1 tour =  $2\pi$  radians)

Le radian sera notre choix !



## Attention à

- Faire un tour et demi

## Attention à

- Faire un tour et demi ( $3\pi$ ) correspond à la même position finale que faire un demi tour ( $\pi$ ).

## Attention à

- Faire un tour et demi ( $3\pi$ ) correspond à la même position finale que faire un demi tour ( $\pi$ ).  
⇒ on parlera souvent de mesure « à  $2\pi$  près ».

## Attention à

- Faire un tour et demi ( $3\pi$ ) correspond à la même position finale que faire un demi tour ( $\pi$ ).  
⇒ on parlera souvent de mesure « à  $2\pi$  près ».
- Faire un demi tour dans un sens ou dans l'autre n'est pas pareil.

## Attention à

- Faire un tour et demi ( $3\pi$ ) correspond à la même position finale que faire un demi tour ( $\pi$ ).  
⇒ on parlera souvent de mesure « à  $2\pi$  près ».
- Faire un demi tour dans un sens ou dans l'autre n'est pas pareil.  
⇒ on parle d'angle orienté lorsque cela est important !

## Attention à

- Faire un tour et demi ( $3\pi$ ) correspond à la même position finale que faire un demi tour ( $\pi$ ).  
⇒ on parlera souvent de mesure « à  $2\pi$  près ».
- Faire un demi tour dans un sens ou dans l'autre n'est pas pareil.  
⇒ on parle d'angle orienté lorsque cela est important !

Dans le plan :

**Orientation positive** Sens anti-horaire


## Attention à

- Faire un tour et demi ( $3\pi$ ) correspond à la même position finale que faire un demi tour ( $\pi$ ).  
⇒ on parlera souvent de mesure « à  $2\pi$  près ».
- Faire un demi tour dans un sens ou dans l'autre n'est pas pareil.  
⇒ on parle d'angle orienté lorsque cela est important !

Dans le plan :

Orientation positive Sens anti-horaire

Orientation négative Sens horaire





# Contenu de la section

## 1 Trigonométrie

- La notion d'angle : généralités
- **Le radian**
- Définitions de sinus, cosinus, ...
- Relation fondamentale
- Symétries
- Formules de trigonométrie
- Fonctions périodiques

# Pourquoi $2\pi$ ?

Un *radian* (1 rad)

# Pourquoi $2\pi$ ?


Un *radian* (1 rad) correspond à l'angle au centre d'un cercle qui intercepte, sur la circonférence

# Pourquoi $2\pi$ ?

Un *radian* (1 rad) correspond à l'angle au centre d'un cercle qui intercepte, sur la circonférence, un arc dont la longueur est égale au rayon du cercle.



# Pourquoi $2\pi$ ?

Un *radian* (1 rad) correspond à l'angle au centre d'un cercle qui intercepte, sur la circonférence, un arc dont la longueur est égale au rayon du cercle.




# Pourquoi $2\pi$ ?

Un *radian* (1 rad) correspond à l'angle au centre d'un cercle qui intercepte, sur la circonférence, un arc dont la longueur est égale au rayon du cercle.



# Pourquoi $2\pi$ ?

Un *radian* (1 rad) correspond à l'angle au centre d'un cercle qui intercepte, sur la circonférence, un arc dont la longueur est égale au rayon du cercle.



Le radian est idéal **pour calculer et manipuler des longueurs d'arcs!**

Pour passer du radian au degré et inversement, retenons que

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ.$$



Pour passer du radian au degré et inversement, retenons que  $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$ . Par habitude, nous retiendrons également le tableau suivant :

Pour passer du radian au degré et inversement, retenons que  $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$ . Par habitude, nous retiendrons également le tableau suivant :

en radians	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$\pi$	$2\pi$
en degrés	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$	$180^\circ$	$360^\circ$

# Contenu de la section

## 1 Trigonométrie

- La notion d'angle : généralités
- Le radian
- Définitions de sinus, cosinus, ...
- Relation fondamentale
- Symétries
- Formules de trigonométrie
- Fonctions périodiques

## Définition

Soit un angle  $\theta$  en radians. Soit  $P$  le point du cercle de centre  $O$  et de rayon 1 qui fait un angle  $\theta$  avec l'horizontale. Alors

## Définition

Soit un angle  $\theta$  en radians. Soit  $P$  le point du cercle de centre  $O$  et de rayon 1 qui fait un angle  $\theta$  avec l'horizontale. Alors

- $\cos \theta$  est l'abscisse du point  $P$ , et

## Définition


Soit un angle  $\theta$  en radians. Soit  $P$  le point du cercle de centre  $O$  et de rayon 1 qui fait un angle  $\theta$  avec l'horizontale. Alors

- $\cos \theta$  est l'abscisse du point  $P$ , et
- $\sin \theta$  est l'ordonnée du point  $P$ .

## Définition

Soit un angle  $\theta$  en radians. Soit  $P$  le point du cercle de centre  $O$  et de rayon 1 qui fait un angle  $\theta$  avec l'horizontale. Alors

- $\cos \theta$  est l'abscisse du point  $P$ , et
- $\sin \theta$  est l'ordonnée du point  $P$ .



## Définition

Un *cercle trigonométrique* est un cercle de rayon 1,



## Définition

Un *cercle trigonométrique* est un cercle de rayon 1, il permet de représenter géométriquement toutes les fonctions trigonométriques.


## Définition


Un *cercle trigonométrique* est un cercle de rayon 1, il permet de représenter géométriquement toutes les fonctions trigonométriques.

Autres fonctions trigonométriques importantes :


$$\tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

$$\cot(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$$





Dans ce cercle,  $\sin(\theta)$  et  $\cos(\theta)$  gardent leur interprétation classique:



Dans ce cercle,  $\sin(\theta)$  et  $\cos(\theta)$  gardent leur interprétation classique:  $\sin$  est « côté opposé sur hypoténuse », etc...

# Pente et angle

## Résultat

Étant donné un repère cartésien *orthonormé*.

# Pente et angle

## Résultat

Étant donné un repère cartésien *orthonormé*. Pour une droite d'équation  $y = mx + p$

# Pente et angle

## Résultat

Étant donné un repère cartésien *orthonormé*. Pour une droite d'équation  $y = mx + p$  formant un angle (orienté)  $\theta$  avec l'horizontale, nous avons



# Pente et angle

## Résultat

Étant donné un repère cartésien *orthonormé*. Pour une droite d'équation  $y = mx + p$  formant un angle (orienté)  $\theta$  avec l'horizontale, nous avons

$$m = \tan \theta$$

# Pente et angle


## Résultat

Étant donné un repère cartésien **orthonormé**. Pour une droite d'équation  $y = mx + p$  formant un angle (orienté)  $\theta$  avec l'horizontale, nous avons

$$m = \tan \theta$$


$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

où  $(x_0, y_0)$  et  $(x_1, y_1)$  sont deux points distincts du graphe de  $f$ .



## Remarque

Cette interprétation ne tient plus si les axes ne sont pas gradués à l'identique :




# Contenu de la section


## 1 Trigonométrie

- La notion d'angle : généralités
- Le radian
- Définitions de sinus, cosinus, ...
- **Relation fondamentale**
- Symétries
- Formules de trigonométrie
- Fonctions périodiques

# Relation fondamentale entre cos et sin




# Relation fondamentale entre cos et sin




Le théorème de Pythagore appliqué dans le cercle trigonométrique implique l'importante relation  $(\cos(\theta))^2 + (\sin(\theta))^2 = 1$ .

# Relation fondamentale entre cos et sin



Le théorème de Pythagore appliqué dans le cercle trigonométrique implique l'importante relation  $(\cos(\theta))^2 + (\sin(\theta))^2 = 1$ . On l'écrira plus souvent sous la forme:

# Relation fondamentale entre cos et sin



Le théorème de Pythagore appliqué dans le cercle trigonométrique implique l'importante relation  $(\cos(\theta))^2 + (\sin(\theta))^2 = 1$ . On l'écrira plus souvent sous la forme:

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$



# Angles remarquables

Voici quelques valeurs importantes des fonctions sinus et cosinus :

angle	sin	cos	tan	cot
0	$\sqrt{0}/2 = 0$	1	0	$\nexists$
$\pi/6$	$\sqrt{1}/2 = 1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}$
$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1	1
$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}/3$
$\pi/2$	$\sqrt{4}/2 = 1$	0	$\nexists$	0

(1.6)

# Angles remarquables

Voici quelques valeurs importantes des fonctions sinus et cosinus :

angle	sin	cos	tan	cot
0	$\sqrt{0}/2 = 0$	1	0	$\nexists$
$\pi/6$	$\sqrt{1}/2 = 1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}$
$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1	1
$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}/3$
$\pi/2$	$\sqrt{4}/2 = 1$	0	$\nexists$	0

(1.6)

Pour ces valeurs particulières: on obtient une des deux (cos ou sin) en lisant [sur le cercle trigonométrique](#), et l'autre

# Angles remarquables

Voici quelques valeurs importantes des fonctions sinus et cosinus :

angle	sin	cos	tan	cot
0	$\sqrt{0}/2 = 0$	1	0	$\nexists$
$\pi/6$	$\sqrt{1}/2 = 1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}$
$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1	1
$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}/3$
$\pi/2$	$\sqrt{4}/2 = 1$	0	$\nexists$	0

(1.6)

Pour ces valeurs particulières: on obtient une des deux (cos ou sin) en lisant [sur le cercle trigonométrique](#), et l'autre [à partir de la relation fondamentale](#).

# Angles remarquables

Voici quelques valeurs importantes des fonctions sinus et cosinus :

angle	sin	cos	tan	cot
0	$\sqrt{0}/2 = 0$	1	0	$\nexists$
$\pi/6$	$\sqrt{1}/2 = 1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$	$\sqrt{3}$
$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1	1
$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	1/2	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}/3$
$\pi/2$	$\sqrt{4}/2 = 1$	0	$\nexists$	0

(1.6)

Pour ces valeurs particulières: on obtient une des deux (cos ou sin) en lisant [sur le cercle trigonométrique](#), et l'autre [à partir de la relation fondamentale](#).

Et ensuite on calcule tan par


$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

# Contenu de la section

## 1 Trigonométrie

- La notion d'angle : généralités
- Le radian
- Définitions de sinus, cosinus, ...
- Relation fondamentale
- **Symétries**
- Formules de trigonométrie
- Fonctions périodiques

# Symétrie par rapport à l'axe des abscisses




$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

$$\tan(-x) = -\tan(x)$$

# Symétrie par rapport à l'axe des abscisses




$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

$$\tan(-x) = -\tan(x)$$

Il est inutile d'apprendre ces relations par coeur, mais il faut savoir **les retrouver en lisant le cercle trigonométrique.**


# Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées



$$\sin(\pi - x) =$$




# Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées



$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$


# Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées



$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\cos(\pi - x) =$$


# Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées



$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$

# Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées




$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$

$$\tan(\pi - x) =$$

# Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées




$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$

$$\tan(\pi - x) = -\tan(x)$$

## Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées




$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$

$$\tan(\pi - x) = -\tan(x)$$

Pour lire  $\pi - x$ : on trace d'abord  $-x$ ,

# Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées




$$\sin(\pi - x) = \sin(x)$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos(x)$$

$$\tan(\pi - x) = -\tan(x)$$

Pour lire  $\pi - x$ : on trace d'abord  $-x$ , puis ajouter  $\pi$  revient à faire un demi-tour (dans le sens horaire).


# Symétrie par rapport à l'origine



$$\sin(\pi + x) =$$




# Symétrie par rapport à l'origine



$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$


# Symétrie par rapport à l'origine



$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$

$$\cos(\pi + x) =$$


# Symétrie par rapport à l'origine



$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$$

# Symétrie par rapport à l'origine




$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$$

$$\tan(\pi + x) =$$

# Symétrie par rapport à l'origine




$$\sin(\pi + x) = -\sin(x)$$

$$\cos(\pi + x) = -\cos(x)$$


$$\tan(\pi + x) = \tan(x)$$

## Symétrie par rapport à la première bissectrice




$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) =$$

## Symétrie par rapport à la première bissectrice



$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$

## Symétrie par rapport à la première bissectrice




$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) =$$




## Symétrie par rapport à la première bissectrice



$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

## Symétrie par rapport à la première bissectrice




$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) =$$

## Symétrie par rapport à la première bissectrice




$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos(x)$$


$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin(x)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot(x)$$


# Angles décalés de $90^\circ$



$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) =$$


Angles décalés de  $90^\circ$ 

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

Angles décalés de  $90^\circ$ 


$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) =$$

Angles décalés de  $90^\circ$ 

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$


Angles décalés de  $90^\circ$ 

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) =$$




Angles décalés de  $90^\circ$ 

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cot(x)$$

# Angles décalés de $90^\circ$



$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos(x)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin(x)$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cot(x)$$

**Morale de cette section:** il faut savoir **retrouver toutes ces relations** à l'aide du cercle trigonométrique.

# Contenu de la section

## 1 Trigonométrie

- La notion d'angle : généralités
- Le radian
- Définitions de sinus, cosinus, ...
- Relation fondamentale
- Symétries
- **Formules de trigonométrie**
- Fonctions périodiques

Il existe des formules qui permettent d'exprimer les sinus et cosinus d'une somme d'angles en fonction des sinus et cosinus des angles de départ:

### Résultat

*Pour tous angles  $A$  et  $B$  (en radians):*

Il existe des formules qui permettent d'exprimer les sinus et cosinus d'une somme d'angles en fonction des sinus et cosinus des angles de départ:

## Résultat

*Pour tous angles  $A$  et  $B$  (en radians):*

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

Il existe des formules qui permettent d'exprimer les sinus et cosinus d'une somme d'angles en fonction des sinus et cosinus des angles de départ:

### Résultat

*Pour tous angles  $A$  et  $B$  (en radians):*

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

Ces formules sont très utiles pour exprimer (par exemple)  $\cos(3x)$ ,  $\sin(5x)$ , etc...

Il existe des formules qui permettent d'exprimer les sinus et cosinus d'une somme d'angles en fonction des sinus et cosinus des angles de départ:

## Résultat

*Pour tous angles  $A$  et  $B$  (en radians):*

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

$$\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

Ces formules sont très utiles pour exprimer (par exemple)  $\cos(3x)$ ,  $\sin(5x)$ , etc... **en fonction uniquement de  $\cos(x)$  et  $\sin(x)$ .**

## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :  
 $\sin(2x) =$



## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(2x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x)$$

## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(2x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x).$$

## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(2x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x).$$

- Pour tout angle  $x$ :  $\cos(2x) =$

## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(2x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x).$$

- Pour tout angle  $x$ :  $\cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$ .

## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(2x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x).$$

- Pour tout angle  $x$ :  $\cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$ .

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(3x) =$$

## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(2x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x).$$

- Pour tout angle  $x$ :  $\cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$ .

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(3x) = \sin(2x + x) =$$

## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(2x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x).$$

- Pour tout angle  $x$ :  $\cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$ .

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(3x) = \sin(2x + x) = \sin(2x)\cos(x) + \cos(2x)\sin(x)$$

## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(2x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x).$$

- Pour tout angle  $x$ :  $\cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$ .

- Pour tout angle  $x$ :

$$\begin{aligned}\sin(3x) &= \sin(2x + x) = \sin(2x)\cos(x) + \cos(2x)\sin(x) \\ &= 2\sin(x)\cos(x)^2 +\end{aligned}$$



## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(2x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x).$$

- Pour tout angle  $x$ :  $\cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$ .

- Pour tout angle  $x$ :

$$\begin{aligned}\sin(3x) &= \sin(2x + x) = \sin(2x)\cos(x) + \cos(2x)\sin(x) \\ &= 2\sin(x)\cos(x)^2 + (\cos(x)^2 - \sin(x)^2)\sin(x)\end{aligned}$$

## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(2x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x).$$

- Pour tout angle  $x$ :  $\cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$ .

- Pour tout angle  $x$ :

$$\begin{aligned}\sin(3x) &= \sin(2x + x) = \sin(2x)\cos(x) + \cos(2x)\sin(x) \\ &= 2\sin(x)\cos(x)^2 + (\cos(x)^2 - \sin(x)^2)\sin(x) \\ &= 3\sin(x)\cos(x)^2 - \sin(x)^3\end{aligned}$$

## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(2x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x).$$

- Pour tout angle  $x$ :  $\cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$ .

- Pour tout angle  $x$ :

$$\begin{aligned}\sin(3x) &= \sin(2x + x) = \sin(2x)\cos(x) + \cos(2x)\sin(x) \\ &= 2\sin(x)\cos(x)^2 + (\cos(x)^2 - \sin(x)^2)\sin(x) \\ &= 3\sin(x)\cos(x)^2 - \sin(x)^3\end{aligned}$$

En utilisant maintenant  $\cos(x)^2 + \sin(x)^2 = 1$  il reste:

## Exemple

- Pour tout angle  $x$ :

$$\sin(2x) = \sin(x)\cos(x) + \cos(x)\sin(x) = 2\sin(x)\cos(x).$$

- Pour tout angle  $x$ :  $\cos(2x) = \cos(x)^2 - \sin(x)^2$ .

- Pour tout angle  $x$ :

$$\begin{aligned}\sin(3x) &= \sin(2x + x) = \sin(2x)\cos(x) + \cos(2x)\sin(x) \\ &= 2\sin(x)\cos(x)^2 + (\cos(x)^2 - \sin(x)^2)\sin(x) \\ &= 3\sin(x)\cos(x)^2 - \sin(x)^3\end{aligned}$$

En utilisant maintenant  $\cos(x)^2 + \sin(x)^2 = 1$  il reste:

$$\sin(3x) = 3\sin(x) - 4\sin(x)^3.$$

On peut montrer de la même manière plein de formules différentes:

On peut montrer de la même manière plein de formules différentes:

$$\cos A \cos B = \frac{\cos(A - B) + \cos(A + B)}{2}$$

$$\sin A \sin B = \frac{\cos(A - B) - \cos(A + B)}{2}$$

$$\sin A \cos B = \frac{\sin(A + B) + \sin(A - B)}{2}$$

$$\cos A \sin B = \frac{\sin(A + B) - \sin(A - B)}{2}$$

$$\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p + q}{2}\right) \cos\left(\frac{p - q}{2}\right)$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin\left(\frac{p + q}{2}\right) \cos\left(\frac{p - q}{2}\right)$$

On peut montrer de la même manière plein de formules différentes:

$$\cos A \cos B = \frac{\cos(A - B) + \cos(A + B)}{2}$$

$$\sin A \sin B = \frac{\cos(A - B) - \cos(A + B)}{2}$$

$$\sin A \cos B = \frac{\sin(A + B) + \sin(A - B)}{2}$$

$$\cos A \sin B = \frac{\sin(A + B) - \sin(A - B)}{2}$$

$$\cos p + \cos q = 2 \cos\left(\frac{p + q}{2}\right) \cos\left(\frac{p - q}{2}\right)$$

$$\sin p + \sin q = 2 \sin\left(\frac{p + q}{2}\right) \cos\left(\frac{p - q}{2}\right)$$

Pour l'examen, **seules les formules donnant  $\sin(A + B)$ ,  $\cos(A + B)$  et  $\tan(A + B)$  seront exigées.** Il sera aussi demandé d'exprimer des nombres de la forme  $\sin(7x)$ ,  $\cos(3x)$ , etc... en fonction de  $\sin(x)$  et  $\cos(x)$  comme ci-dessus.

# Contenu de la section

## 1 Trigonométrie

- La notion d'angle : généralités
- Le radian
- Définitions de sinus, cosinus, ...
- Relation fondamentale
- Symétries
- Formules de trigonométrie
- Fonctions périodiques



# Fonctions périodiques

## Définition

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T > 0$  un nombre réel.

# Fonctions périodiques

## Définition

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T > 0$  un nombre réel. On dit que  $f$  est **périodique de période  $T$**  si, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x + T) = f(x).$$

# Fonctions périodiques

## Définition

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T > 0$  un nombre réel. On dit que  $f$  est **périodique de période  $T$**  si, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x + T) = f(x).$$

On appelle **période de  $f$**  le plus petit nombre  $T$  vérifiant ça.

# Fonctions périodiques

## Définition

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T > 0$  un nombre réel. On dit que  $f$  est **périodique de période  $T$**  si, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x + T) = f(x).$$

On appelle **période de  $f$**  le plus petit nombre  $T$  vérifiant ça.

## Exemple

- sin et cos

# Fonctions périodiques

## Définition

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T > 0$  un nombre réel. On dit que  $f$  est **périodique de période  $T$**  si, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x + T) = f(x).$$

On appelle **période de  $f$**  le plus petit nombre  $T$  vérifiant ça.

## Exemple

- $\sin$  et  $\cos$  sont  $2\pi$ -périodiques. (Rajouter  $2\pi$  c'est faire un tour de cercle trigonométrique).

# Fonctions périodiques

## Définition

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T > 0$  un nombre réel. On dit que  $f$  est **périodique de période  $T$**  si, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x + T) = f(x).$$

On appelle **période de  $f$**  le plus petit nombre  $T$  vérifiant ça.

## Exemple

- sin et cos sont  $2\pi$ -périodiques. (Rajouter  $2\pi$  c'est faire un tour de cercle trigonométrique).
- $\tan = \frac{\sin}{\cos}$  est alors aussi  $2\pi$ -périodique.

# Fonctions périodiques

## Définition

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T > 0$  un nombre réel. On dit que  $f$  est **périodique de période  $T$**  si, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x + T) = f(x).$$

On appelle **période de  $f$**  le plus petit nombre  $T$  vérifiant ça.

## Exemple

- sin et cos sont  $2\pi$ -périodiques. (Rajouter  $2\pi$  c'est faire un tour de cercle trigonométrique).
- $\tan = \frac{\sin}{\cos}$  est alors aussi  $2\pi$ -périodique. Mais: tan est en fait  $\pi$ -périodique, car:

$$\tan(\pi + x) =$$

# Fonctions périodiques

## Définition

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T > 0$  un nombre réel. On dit que  $f$  est **périodique de période  $T$**  si, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x + T) = f(x).$$

On appelle **période de  $f$**  le plus petit nombre  $T$  vérifiant ça.

## Exemple

- sin et cos sont  $2\pi$ -périodiques. (Rajouter  $2\pi$  c'est faire un tour de cercle trigonométrique).
- $\tan = \frac{\sin}{\cos}$  est alors aussi  $2\pi$ -périodique. Mais: tan est en fait  $\pi$ -périodique, car:

$$\tan(\pi + x) = \frac{\sin(\pi + x)}{\cos(\pi + x)} =$$



# Fonctions périodiques

## Définition

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T > 0$  un nombre réel. On dit que  $f$  est **périodique de période  $T$**  si, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x + T) = f(x).$$

On appelle **période de  $f$**  le plus petit nombre  $T$  vérifiant ça.

## Exemple

- sin et cos sont  $2\pi$ -périodiques. (Rajouter  $2\pi$  c'est faire un tour de cercle trigonométrique).
- $\tan = \frac{\sin}{\cos}$  est alors aussi  $2\pi$ -périodique. Mais: tan est en fait  $\pi$ -périodique, car:

$$\tan(\pi + x) = \frac{\sin(\pi + x)}{\cos(\pi + x)} = \frac{-\sin(x)}{-\cos(x)} =$$

# Fonctions périodiques

## Définition

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T > 0$  un nombre réel. On dit que  $f$  est **périodique de période  $T$**  si, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x + T) = f(x).$$

On appelle **période de  $f$**  le plus petit nombre  $T$  vérifiant ça.

## Exemple

- sin et cos sont  $2\pi$ -périodiques. (Rajouter  $2\pi$  c'est faire un tour de cercle trigonométrique).
- $\tan = \frac{\sin}{\cos}$  est alors aussi  $2\pi$ -périodique. Mais: tan est en fait  $\pi$ -périodique, car:

$$\tan(\pi + x) = \frac{\sin(\pi + x)}{\cos(\pi + x)} = \frac{-\sin(x)}{-\cos(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} =$$

# Fonctions périodiques

## Définition

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T > 0$  un nombre réel. On dit que  $f$  est **périodique de période  $T$**  si, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x + T) = f(x).$$

On appelle **période de  $f$**  le plus petit nombre  $T$  vérifiant ça.

## Exemple

- sin et cos sont  $2\pi$ -périodiques. (Rajouter  $2\pi$  c'est faire un tour de cercle trigonométrique).
- $\tan = \frac{\sin}{\cos}$  est alors aussi  $2\pi$ -périodique. Mais: tan est en fait  $\pi$ -périodique, car:

$$\tan(\pi + x) = \frac{\sin(\pi + x)}{\cos(\pi + x)} = \frac{-\sin(x)}{-\cos(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \tan(x).$$

# Fonctions périodiques

## Définition

Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction et  $T > 0$  un nombre réel. On dit que  $f$  est **périodique de période  $T$**  si, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x + T) = f(x).$$

On appelle **période de  $f$**  le plus petit nombre  $T$  vérifiant ça.

## Exemple

- $\sin$  et  $\cos$  sont  $2\pi$ -périodiques. (Rajouter  $2\pi$  c'est faire un tour de cercle trigonométrique).
- $\tan = \frac{\sin}{\cos}$  est alors aussi  $2\pi$ -périodique. Mais:  $\tan$  est en fait  $\pi$ -périodique, car:

$$\tan(\pi + x) = \frac{\sin(\pi + x)}{\cos(\pi + x)} = \frac{-\sin(x)}{-\cos(x)} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \tan(x).$$

La **période de  $\tan$**  est donc  $\pi$  (le demi-tour).

# Contenu de la section

## 2 Géométrie analytique

# Géométrie analytique

La géométrie analytique est une manière d'aborder des problèmes de géométrie

# Géométrie analytique

La géométrie analytique est une manière d'aborder des problèmes de géométrie grâce à un ou plusieurs systèmes de coordonnées.

# Géométrie analytique

La géométrie analytique est une manière d'aborder des problèmes de géométrie grâce à un ou plusieurs systèmes de coordonnées. **Et en faisant des calculs.**



# Géométrie analytique

La géométrie analytique est une manière d'aborder des problèmes de géométrie grâce à un ou plusieurs systèmes de coordonnées. **Et en faisant des calculs.**

On donne quelques exemples dans le plan:

# Coordonnées cartésiennes


## Définition

Un repère cartésien est la donnée de deux axes sécants, et d'une unité sur chaque axe. L'intersection des axes est appelée l'origine.

# Coordonnées cartésiennes

## Définition

Un repère cartésien est la donnée de deux axes sécants, et d'une unité sur chaque axe. L'intersection des axes est appelée l'origine. Les coordonnées cartésiennes d'un point  $P$  du plan sont alors obtenues en projetant ce point sur chacun des axes, et en repérant la projection par rapport à l'unité.



Ayant un système de coordonnées, nous avons donc l'équivalence entre

Ayant un système de coordonnées, nous avons donc l'équivalence entre

- les points du plan et

Ayant un système de coordonnées, nous avons donc l'équivalence entre

- les points du plan et

Ayant un système de coordonnées, nous avons donc l'équivalence entre

- les points du plan et
- les éléments de  $\mathbb{R}^2$  (via les coordonnées des points)

# Contenu de la section

- 2 Géométrie analytique
  - Points et vecteurs
  - Opérations de base



## Définition

Un élément de  $\mathbb{R}^n$  peut être vu comme un *point*,

## Définition

Un élément de  $\mathbb{R}^n$  peut être vu comme un *point*, et il s'écrit alors avec  $n$  nombres réels appelés ses *coordonnées*,

## Définition

Un élément de  $\mathbb{R}^n$  peut être vu comme un *point*, et il s'écrit alors avec  $n$  nombres réels appelés ses *coordonnées*, que nous notons généralement  $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ .

## Définition

Un élément de  $\mathbb{R}^n$  peut être vu comme un *point*, et il s'écrit alors avec  $n$  nombres réels appelés ses *coordonnées*, que nous notons généralement  $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ .

Lorsque  $n = 2$ : les coordonnées sont appelées *l'abscisse et l'ordonnée* (souvent notées  $x$  et  $y$ )

## Définition

Un élément de  $\mathbb{R}^n$  peut être vu comme un *point*, et il s'écrit alors avec  $n$  nombres réels appelés ses *coordonnées*, que nous notons généralement  $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ .

Lorsque  $n = 2$ : les coordonnées sont appelées *l'abscisse et l'ordonnée* (souvent notées  $x$  et  $y$ )

## Exemple

Le point  $(1, -1)$  de  $\mathbb{R}^2$  désigne l'élément du plan

## Définition

Un élément de  $\mathbb{R}^n$  peut être vu comme un *point*, et il s'écrit alors avec  $n$  nombres réels appelés ses *coordonnées*, que nous notons généralement  $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ .

Lorsque  $n = 2$ : les coordonnées sont appelées *l'abscisse et l'ordonnée* (souvent notées  $x$  et  $y$ )

## Exemple

Le point  $(1, -1)$  de  $\mathbb{R}^2$  désigne l'élément du plan dont l'abscisse vaut 1 et l'ordonnée vaut  $-1$ .

## Définition

Un élément de  $\mathbb{R}^n$  peut aussi être vu comme *un vecteur*,

## Définition

Un élément de  $\mathbb{R}^n$  peut aussi être vu comme *un vecteur*, et ses constituants sont *les composantes* du vecteur.



## Définition

Un élément de  $\mathbb{R}^n$  peut aussi être vu comme *un vecteur*, et ses constituants sont *les composantes* du vecteur.

## Remarque

Un vecteur représente un déplacement : une translation.

## Définition

Un élément de  $\mathbb{R}^n$  peut aussi être vu comme *un vecteur*, et ses constituants sont *les composantes* du vecteur.

## Remarque

Un vecteur représente un déplacement : une translation. C'est "une flèche" entre deux points.

## Définition

Un élément de  $\mathbb{R}^n$  peut aussi être vu comme *un vecteur*, et ses constituants sont *les composantes* du vecteur.

## Remarque

Un vecteur représente un déplacement : une translation. C'est "une flèche" entre deux points.

## Exemple

Le vecteur  $(-1,1)$  de  $\mathbb{R}^2$

## Définition

Un élément de  $\mathbb{R}^n$  peut aussi être vu comme *un vecteur*, et ses constituants sont *les composantes* du vecteur.

## Remarque

Un vecteur représente un déplacement : une translation. C'est "une flèche" entre deux points.

## Exemple

Le vecteur  $(-1,1)$  de  $\mathbb{R}^2$  indique une translation dans la direction « Nord-Ouest » sur le plan.

## Différence entre point et vecteur

La différence, fondamentale et intuitive entre point et vecteur est:

## Différence entre point et vecteur

La différence, fondamentale et intuitive entre point et vecteur est:

- que le point représente un état, une position

## Différence entre point et vecteur

La différence, fondamentale et intuitive entre point et vecteur est:

- que le point représente un état, une position
- tandis que le vecteur représente une évolution, un mouvement, une direction.

## Différence entre point et vecteur

La différence, fondamentale et intuitive entre point et vecteur est:

- que le point représente un état, une position
- tandis que le vecteur représente une évolution, un mouvement, une direction.

## Remarque



## Différence entre point et vecteur

La différence, fondamentale et intuitive entre point et vecteur est:

- que le point représente un état, une position
- tandis que le vecteur représente une évolution, un mouvement, une direction.

## Remarque

Mais les deux sont représentés par des éléments de  $\mathbb{R}^n$  !

Un vecteur se représentera sous la forme d'une flèche.

Un vecteur se représentera sous la forme d'une flèche.

Le vecteur qui va du point  $x$  au point  $y$  se note généralement  $\overrightarrow{xy}$ .

Un vecteur se représentera sous la forme d'une flèche.

Le vecteur qui va du point  $x$  au point  $y$  se note généralement  $\overrightarrow{xy}$ . Ses composantes sont données en prenant la différence entre les coordonnées de  $y$  (le point d'arrivée) et celles de  $x$  (le point de départ).

Un vecteur se représentera sous la forme d'une flèche.

Le vecteur qui va du point  $x$  au point  $y$  se note généralement  $\overrightarrow{xy}$ . Ses composantes sont données en prenant la différence entre les coordonnées de  $y$  (le point d'arrivée) et celles de  $x$  (le point de départ). Par exemple, dans  $\mathbb{R}^3$ :

$$\overrightarrow{xy} = \begin{pmatrix} y_1 - x_1 \\ y_2 - x_2 \\ y_3 - x_3 \end{pmatrix}$$

Un vecteur se représentera sous la forme d'une flèche.

Le vecteur qui va du point  $x$  au point  $y$  se note généralement  $\overrightarrow{xy}$ . Ses composantes sont données en prenant la différence entre les coordonnées de  $y$  (le point d'arrivée) et celles de  $x$  (le point de départ).

Par exemple, dans  $\mathbb{R}^3$ :

$$\overrightarrow{xy} = \begin{pmatrix} y_1 - x_1 \\ y_2 - x_2 \\ y_3 - x_3 \end{pmatrix}$$

Un vecteur est donné sans point de départ: c'est une direction.

Un vecteur se représentera sous la forme d'une flèche.

Le vecteur qui va du point  $x$  au point  $y$  se note généralement  $\overrightarrow{xy}$ . Ses composantes sont données en prenant la différence entre les coordonnées de  $y$  (le point d'arrivée) et celles de  $x$  (le point de départ). Par exemple, dans  $\mathbb{R}^3$ :

$$\overrightarrow{xy} = \begin{pmatrix} y_1 - x_1 \\ y_2 - x_2 \\ y_3 - x_3 \end{pmatrix}$$

Un vecteur est donné sans point de départ: c'est une direction. Par exemple, dans  $\mathbb{R}^2$ , la direction « nord-ouest » est donnée par le vecteur  $(-1,1)$ .

# Contenu de la section

- 2 Géométrie analytique
  - Points et vecteurs
  - Opérations de base



Si  $\vec{x}$  et  $\vec{y}$  sont des éléments de  $\mathbb{R}^n$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ , on peut **sommer deux vecteurs** et **multiplier un vecteur par un réel**.

Si  $\vec{x}$  et  $\vec{y}$  sont des éléments de  $\mathbb{R}^n$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ , on peut **sommer deux vecteurs** et **multiplier un vecteur par un réel**. Tout se fait coordonnée par coordonnée:


Si  $\vec{x}$  et  $\vec{y}$  sont des éléments de  $\mathbb{R}^n$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$ , on peut **sommer deux vecteurs** et **multiplier un vecteur par un réel**. Tout se fait coordonnée par coordonnée:

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$$

$$(x_1, \dots, x_n) - (y_1, \dots, y_n) = (x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n)$$

$$\lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$$

- la somme de deux vecteurs est donnée par la règle du parallélogramme ;
- la multiplication par un réel (on dira aussi « par un scalaire ») multiplie la longueur.



# Quelques précisions

- la différence de deux **points** est un vecteur allant du second vers le premier :  $\mathbf{p} - \mathbf{q}$  est le vecteur  $\overrightarrow{qp}$  ;

# Quelques précisions

- la différence de deux **points** est un vecteur allant du second vers le premier :  $\mathbf{p} - \mathbf{q}$  est le vecteur  $\overrightarrow{qp}$  ;
- la somme d'un **point** et d'un **vecteur** représente un déplacement à partir de ce point dans la direction du vecteur donné : le résultat est **un point** ;

# Quelques précisions

- la différence de deux **points** est un vecteur allant du second vers le premier :  $\mathbf{p} - \mathbf{q}$  est le vecteur  $\overrightarrow{qp}$  ;
- la somme d'un **point** et d'un **vecteur** représente un déplacement à partir de ce point dans la direction du vecteur donné : le résultat est **un point** ;
- la somme de deux ou plusieurs **vecteurs** représente la composée de déplacements successifs : le résultat est un vecteur.

# Quelques précisions

- la différence de deux **points** est un vecteur allant du second vers le premier :  $\mathbf{p} - \mathbf{q}$  est le vecteur  $\overrightarrow{qp}$  ;
- la somme d'un **point** et d'un **vecteur** représente un déplacement à partir de ce point dans la direction du vecteur donné : le résultat est un **point** ;
- la somme de deux ou plusieurs **vecteurs** représente la composée de déplacements successifs : le résultat est un vecteur.

## Exemple

Si on considère  $\mathbf{p} = (1,2)$  comme un point, et  $\vec{w} = (-1,1)$  comme un vecteur (donnant la direction « Nord-Ouest »), alors on conçoit leur somme  $\mathbf{p} + \vec{w} = (1,2) + (-1,1) = (0,3)$  comme le point obtenu en translatant le point de départ,  $\mathbf{p}$ , dans la direction donnée  $\vec{w}$ .



## Définition

L'élément particulier  $(0,0,\dots,0)$  se note  $\vec{0}$  et est appelé *vecteur nul*.

## Définition

L'élément particulier  $(0,0,\dots,0)$  se note  $\vec{0}$  et est appelé *vecteur nul*.

Il représente une translation... de vecteur nul.

## Définition

L'élément particulier  $(0,0,\dots,0)$  se note  $\vec{0}$  et est appelé *vecteur nul*.

Il représente une translation... de vecteur nul.

## Résultat

Quel que soit le vecteur  $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ , nous avons

$$x + \vec{0} = \vec{0} + x = x.$$

# Décomposition selon les axes de coordonnées

Regardons le cas  $n = 3$ .

# Décomposition selon les axes de coordonnées

Regardons le cas  $n = 3$ . Si nous notons  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$  les vecteurs suivants :

$$\vec{e}_1 = (1,0,0)$$

$$\vec{e}_2 = (0,1,0)$$

$$\vec{e}_3 = (0,0,1)$$

# Décomposition selon les axes de coordonnées

Regardons le cas  $n = 3$ . Si nous notons  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$  les vecteurs suivants :

$$\vec{e}_1 = (1,0,0) \qquad \vec{e}_2 = (0,1,0) \qquad \vec{e}_3 = (0,0,1)$$

alors tout vecteur  $\vec{x}$  de  $\mathbb{R}^3$  peut s'écrire:

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + x_3 \vec{e}_3.$$

# Décomposition selon les axes de coordonnées

Regardons le cas  $n = 3$ . Si nous notons  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$  les vecteurs suivants :

$$\vec{e}_1 = (1,0,0) \qquad \vec{e}_2 = (0,1,0) \qquad \vec{e}_3 = (0,0,1)$$

alors tout vecteur  $\vec{x}$  de  $\mathbb{R}^3$  peut s'écrire:

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + x_3 \vec{e}_3.$$

On peut généraliser à toutes les valeurs de  $n$ , avec

$$\vec{e}_1 = (1,0,\dots,0), \quad \vec{e}_2 = (0,1,0,\dots,0), \dots, \quad \vec{e}_n = (0,\dots,0,1).$$

# Décomposition selon les axes de coordonnées

Regardons le cas  $n = 3$ . Si nous notons  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$  les vecteurs suivants :

$$\vec{e}_1 = (1,0,0) \qquad \vec{e}_2 = (0,1,0) \qquad \vec{e}_3 = (0,0,1)$$

alors tout vecteur  $\vec{x}$  de  $\mathbb{R}^3$  peut s'écrire:

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + x_3 \vec{e}_3.$$

On peut généraliser à toutes les valeurs de  $n$ , avec

$$\vec{e}_1 = (1,0,\dots,0), \quad \vec{e}_2 = (0,1,0,\dots,0), \dots, \quad \vec{e}_n = (0,\dots,0,1).$$

## Remarque

Attention, ici  $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$  sont des vecteurs eux-mêmes.



# Décomposition selon les axes de coordonnées

Regardons le cas  $n = 3$ . Si nous notons  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$  les vecteurs suivants :

$$\vec{e}_1 = (1,0,0) \qquad \vec{e}_2 = (0,1,0) \qquad \vec{e}_3 = (0,0,1)$$

alors tout vecteur  $\vec{x}$  de  $\mathbb{R}^3$  peut s'écrire:

$$\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + x_3 \vec{e}_3.$$

On peut généraliser à toutes les valeurs de  $n$ , avec

$$\vec{e}_1 = (1,0,\dots,0), \quad \vec{e}_2 = (0,1,0,\dots,0), \dots, \quad \vec{e}_n = (0,\dots,0,1).$$

## Remarque

Attention, ici  $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$  sont des vecteurs eux-même. Pour l'exemple,  $x_1$  et  $\vec{e}_1$  ont donc des rôles fondamentalement différents : le premier est un réel (ou « scalaire »), le second est un vecteur.

- la différence de deux **points** est un vecteur allant du second vers le premier :  $\mathbf{p} - \mathbf{q}$  est le vecteur  $\overrightarrow{qp}$  ;